

Clé des amanites printanières des Landes

Espèces munies d'une volve membraneuse ou circonscise ; verrues absentes sur le chapeau, éventuellement quelques lambeaux de voile.

- ♦ Chapeau strié au bord. Anneau fragile, souvent disparu, oblitéré ou rudimentaire
 *A. junquillea* Quél.
 (à chapeau ocracé sale à grisâtre, boucles présentes : *A. gioiosa* Currelli est à rechercher sur la côte atlantique)
- ♦ Chapeau non strié.
 - Anneau présent. Pied lisse
 - * Anneau ample, épais. Bulbe typiquement bulbeux-fusifforme, longuement ensablé
 *A. gilbertii* Beauseign.
 - * Anneau mince, souvent plaqué au pied. Bulbe arrondi, peu ensablé
 *A. decipiens* (Trimbach) Jacquet.
 - Anneau absent. Pied chiné sur toute sa longueur. Bulbe arrondi ou tronqué, peu ensablé.
 - * Peu massif, spores cylindracées 13-15 x 5-6,5 µm
 *A. curtipes* Gilbert
 - * Massif, spores elliptiques 10-13 x 7-8 µm
 *A. ponderosa* Malençon & R. Heim

Espèces dépourvues de volve, à voile général floconneux laissant sur le chapeau des verrues ou des flocons détersiles.

- ♦ Lames rose saumoné d'emblée. Verrues piléiques pyramidales émoussées, aréo-
 lées, réparties irrégulièrement. Couleur de fond ocracé jaunâtre
 *A. beillei* (Beauseign.) Bon & Contu
- ♦ Lames longtemps blanc pur, devenant ocracées sur le tard. Verrues piléiques
 pyramidales aiguës, densément réparties mais très labiles. Couleur de fond blanc
 pur
 *A. boudieri* Barla