

## **Hygrocybe virginea.**

### **Habitat :**

Quelques exemplaires groupés trouvés le 27 octobre 2010 dans un taillis herbeux d'une vieille prairie envahie par les buissons de pruneliers au Bois Carré à Baume-les-Dames, en contrebas de la carrière Climent.



### **Chapeau :**

Jusqu'à 45 mm, convexe puis convexe irrégulier, à centre aplani ou même creusé, parfois assez nettement, marge assez longtemps courtement enroulée puis plus droite, revêtement lisse, plus ou moins bossué, blanc, mais parfois lavé de grisâtre pâle quand il est imbu ou âgé, plissé par transparence vers la marge.

### **Lames :**

Jusqu'à 5-6 mm, longuement décurrentes sur le stipe, espacées, crispées dans les sinus, blanches. Arête concolore, ondulée, fimbriée.

### **Stipe :**

45-70 x 2,5-7,5 mm, droit mais le plus souvent arqué, tordu, parfois vers la base, lisse mais semblant subtilement poudré sous la loupe, faiblement bossué, parfois sillonné longitudinalement, assez régulier sauf sous les lames où il est évasée et à la base qui s'amincit.

### **Chair :**

Blanche, inodore et douce.


## Microscopie :

**Spores (A) :** 8,1-10,8 x 4,8-5,8 ;  $Q_e = 1,7$  ; elliptiques ou subglobuleuses.

**Basides (B) :** 40,5-47 x 6,5-72  $\mu\text{m}$ , généralement quadrisporiques et bisporie plus rare.

**Articles du suprapellis (C) :** formé d'hyphes de 1,5-5  $\mu\text{m}$ , plus ou moins parallèles à emmêlés.

**Trame (D) :** emmêlée, formée d'éléments assez courts de 6-14  $\mu\text{m}$  de large.



## Discussion :

Hygrophore comestible, très fréquent, facile à reconnaître par sa blancheur quasi immaculée.