

**Lepista nuda (Bull.) Cooke**  
**Basionyme : Agaricus nudus Bull. 1798**  
(Description d'un spécimen de grande taille)

**Habitat :**

Un exemplaire de taille impressionnante récolté le 11 novembre 2010 au bois de la République, dans une forêt bordant des prés et constituée essentiellement de pins avec quelques noisetiers et un merisier, entre le bois de la République proprement dit et les Combolards.



**Chapeau :**

170 mm, plan à un peu affaissé, avec la marge nettement relevée par endroits, confusément plissée. Extrémité irrégulière, onduleuse à « monticulée ». Revêtement, onduleux, un peu gras, lisse (très finement soyeux sous la loupe) et sec, d'un beau violet profond assez uniforme, sauf au centre où il se nuance de brunâtre, se salissant en brun le lendemain.

**Lames :**

Jusqu'à 10 mm, émarginées, serrées, assez épaisses, violette et brunissant. Arête irrégulière, parfois échancrées, concolore ou brunie.

**Stipe :**

50 x 20 mm, court, trapu, épais, droit, évasé sous les lames et bulbeux à la base. Base ronde, nettement marquée mais non marginée. Couvert d'une pruine blanchâtre sur fond violacé pouvant virer au brun. Rugueux, veiné (confusément).

## Chair :

Assez ferme, blanche mais violacée en haut du stipe, odeur caractéristique mais difficile à définir, complexe, fruitée mais avec un mélange d'odeur qui rappelle celle qui s'échappe d'un lave-vaisselle ouvert. Saveur douce.


## Microscopie :

**Spores (A) :** (6,1) 6,5 - 7,6 (8,5) x (3,6) 3,9 - 4,4 (4,7)  $\mu\text{m}$  ; Q = (1,5) 1,6 - 1,8 (2) ; N = 83 ; Me = 7 x 4,1  $\mu\text{m}$  ; Qe = 1,7 ; elliptiques à elliptiques étirées, finement verruqueuses, guttulées.

**Basides (B) :** 31-36,5 x 6,4-7,7  $\mu\text{m}$ , cylindriques, quadrisporiques, bouclées.

**Cystides :** non observées.

**Articles du suprapellis (C) :** 2,5-6,5  $\mu\text{m}$  d'épaisseur très grossièrement parallèles et bouclés, s'épaississant en profondeur jusqu'à 10,5  $\mu\text{m}$ .



## Discussion :

Cette espèce d'arrière saison, fort répandue et d'une comestibilité appréciée est de ce fait notoirement reconnue mais il est assez rare de trouver des exemplaires encore frais atteignant presque 20 cm de circonférence du chapeau.