

Cortinarius mirandus

Moenne-Loccoz & Reumaux

Christophe Florey, Isabelle Favre, Claude Boujon

Lors de la rencontre de la commission scientifique suisse, le 24 septembre 2007 à Crans Montana, Claude Boujon et Isabelle Favre m'ont présenté un cortinaire encore jamais décrit à ma connaissance en Valais. Pourtant il devrait être courant !

En effet, en y faisant plus attention, je l'ai rencontré à maintes reprises, par exemple aux mayens de Chamoson. (C.Florey)

Description macroscopique (C.Boujon et I.Favre)

Habitat : sur souche pourrie et moussue de mélèze.

Chapeau : jusqu'à 4cm de diamètre, convexe puis plan, à marge un peu retroussée à la fin. Cuticule d'aspect feutré, brun à brun rouille.

Lames : moyennement espacées, ventruées, adnées, brun rouge.

Stipe : jusqu'à 2cm de long x 6mm de diamètre, s'évasant un peu vers la base (8mm), feutré à pelucheux, brun rouge vif, à mycélium rose en bas, +/- creux en coupe longitudinale.

Chair : brun jaune dans le chapeau, rouge vif dans le cortex du stipe, jaune au centre. Odeur un peu terreuse et de moisi, saveur très légèrement amarescente à terreuse et de moisi.

Lieu de récolte : Lac des Miriougues, Crans Montana, 24 sept. 2007

alt. 1333 m.

Remarque : plusieurs autres récoltes, par d'autres participants, le même jour, dans la même région, sur souches de mélèze, confirmées par analyse microscopique.

Microscopie : (C.Florey) : spores ellipsoïdales, moyennement verruqueuses 7-8 x 5 µm .

Référence : Atlas des Cortinaires, Bidaud & Coll ; pars VI, planche 128.

Cortinarius mirandus

photo : C.Florey

