

C. veraprilis G. Chevassut, R. Henry & G. Rioussset **Pl. 104**

(1986, Doc. Mycol. XVII (65) : 57,60, basionyme)

Herb. P. Moëgne-L. n° 594.

Sous-Genre : *Phlegmacium* - Section : *Caerulescentes* - Sous-Section : *Caerulescentes* - Série : *Caesiocanescens* - *Stirps* : *Caesiocanescens*.

NOTES DE RÉCOLTE - Les exemplaires sont particulièrement denses et lourds (comme *Boletus torosus*) et deviennent gris jaunâtre sordide en séchant.

Chapeau (30-80 µm), massif, très épais, convexe-hémisphérique puis plan-convexe à centre plus ou moins déprimé, à marge enroulée puis infléchie, seule la marginelle reste enroulée. Revêtement visqueux mais vite sec et mat, d'un violet foncé et rapidement bleu cendré, un peu fibrilleux, se décolorant en gris beige sordide, à centre parfois couvert d'un voile blanc épais, dissocié en plaques.

Stipe 30-60 x 15-30 (40) mm, court et trapu, légèrement clavé jusqu'à un bulbe marginé, parfois submarginé-arrondi, fortement fibrillo-laineux, concolore au chapeau, se tachant par places d'ochracé roussâtre. Forte cortine violacée.

Chair jaunâtre, bleutée au sommet du stipe et jaune ochracé dans le bulbe. Odeur désagréable de pourriture de pomme de terre, saveur douce.

Lames très étroites (3-4 mm), serrées, sinuées-émarginées, d'un bleu violet profond puis bleu cendré ; arête entière, concolore.

Réactions chimiques : NaOH (20 %) donne un beau roux orangé sur le cutis et la phénolaniline réagit, sur la chair, en pourpre sombre. Réactions nulles avec les autres réactifs usuels.

Quelques exemplaires envoyés par L. Rioussset le 15.04.1987, de la station princeps : Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), sous chênes verts (Herb. P. Moëgne-L. n° 594).

MICROSCOPIE - Revêtement pileux composé d'un épicutis gélifié