

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karsten
Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 20, 1881.

Chapeau :

5-20 cm de diam., convexe-étalé puis déprimé, couvert de grosses écailles brun foncé sur fond plus pâle, pointues-dressées au centre

Aiguillons :

5-10 mm de longueur, non décurrents, blancs puis brunissant avec l'âge

Pied :

5-8 x 2-5 cm, atténué ou renflé à la base, blanchâtre ou brun

Chair :

ferme, blanche, à odeur et saveur indistinctes

Sporée :

brune

Spores :

subglobuleuses, verruqueuses-tuberculées, 6-8 x 5-7 µm

Habitat :

sur sol sous épinettes; très rare

Saison :

août à septembre

Comestibilité :

comestible
moins bon que *S. squamosus*

Remarques :

S. squamosus diffère par son chapeau légèrement déprimé, à écailles non ou légèrement pointues au centre, son pied trapu, atténué ou appointi vers la base, plus pâle vers l'apex, ses spores un peu plus petites, 5-6 x 3,5-4 µm, et sa pousse sous pins. *S. scabrosus* a une saveur très amère. On doit goûter le champignon pour s'assurer de son identité, car *S. imbricatus* et *S. scabrosus* poussent parfois ensemble.

Références :

Mille et un champignons du Québec, Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal 2002.
Adaptation : Roland Labbé, février 2011.