

Chiave di determinazione Sarcodon

1. Ife, almeno in parte, con fibbie.

2. Ife senza fibbie.

1.1. Cappello con rivestimento formato da grandi scaglie grossolane, più o meno rialzate, disposte più o meno concentricamente, che danno un aspetto crepato. Carne biancastra, brunastra molto pallida, sapore amarescente, ife con fibbie. Sotto conifere, in particolare pini. -> **Sarcodon imbricatus** (L.) P. Karst. (1881) [=Hydnum imbricatum L. (1753)]

1.x. Cappello senza scaglie grossolane.

1.2. Cappello con rivestimento liscio, finemente vellutato, screpolato, squamuloso verso il centro con squame rialzate. Carne biancastra con riflessi rosati, blu verdastra alla base del gambo, sapore un po' acre, un po' di ife con fibbie. Sotto conifere con mirtili. -> **Sarcodon glaucopus** Maas Geest. & Nannf. (1969)

1.3. Cappello con rivestimento liscio, feltrato a pelle di daino o con scaglie più o meno distinte. Carne biancastra, un po' grigio violacea alla base del gambo, sapore un po' amaro e acre, ife con fibbie. Sotto conifere o latifoglie. -> **Sarcodon leucopus** (Pers.) Maas Geest. & Nannf. (1969) [=Sarcodon laevigatus sensu auct.]

2.1. Carne violaceo rosata, almeno nel cappello, a maturità.

2.2. Carne al massimo un po' rosata.

2.1.1. Cappello con rivestimento fibrilloso o finemente squamuloso verso il centro, poi subliscio. Carne rosata, poi violaceo rosata e infine viola scura, sapore acre non amaro. Sotto latifoglie, in particolare querce, castagni, faggi. -> **Sarcodon joeides** (Pass.) Bataille (1924) [=Hydnum jonides Pass. (1872)]

2.1.2. Cappello con rivestimento feltrato, poi finemente squamuloso verso il centro, poi subliscio e areolato. Carne rosata, poi violaceo rosata nel cappello, rossastra nel gambo, grigio verdastra alla base del gambo, sapore acre. Sotto conifere. -> **Sarcodon fuligineoviolaceus** (Kalchbr.) Pat. (1900) [=Hydnum fuligineoviolaceum Kalchbr. (1874)]

2.2.1. Cappello con rivestimento formato da scaglie grossolane, più o meno rialzate, disposte più o meno concentricamente. Carne biancastra, rosata molto pallida, blu verde alla base del gambo, sapore fortemente amaro, ife senza fibbie. Sotto latifoglie e più raramente conifere. -> **Sarcodon scabrosus** (Fr.) P. Karst. (1881) [=Hydnum scabrosum Fr. (1836)]

2.2.2. Cappello con rivestimento vellutato, con squame con la punta più o meno eretta. Carne biancastra un po' giallastra, verdastra alla base del gambo, ife senza fibbie. Sotto querce. -> **Sarcodon illudens** Maas Geest. (1976)

1 comment to Chiave di determinazione Sarcodon

[...] 4.6. Carpori con gambo centrale o eccentrico, terrestri; carne friabile, molle o compatta, senza odore di fieno greco, non suberosa, non zonata, monomitica, ife con o senza fibbie; senza cistidi; sporata brunastra, spore irregolari, verrucose, gibbose. -> Bankeraceae: Sarcodon [...]