

## **Tricholoma focale (Fr.) Ricken**

### **Habitat :**

Plusieurs exemplaires sous un pin sylvestre et dans la haute herbe en bordure d'un chemin, non loin du petit étang trouvés à Bretigney le 14 novembre 2015. Leg. Bernard Jarroux.



### **Chapeau :**

Jusqu'à 105 mm, d'abord convexe puis plan convexe et dans l'extrême vieillesse avec l'ambitus qui peut se relever très légèrement et le centre faiblement bombé, revêtement sec, luisant, couvert de fibrilles radiales, comme peigné, brun jaune à brun roussâtre, grossièrement vers Séguy 203, pouvant s'assombrir au centre mais non de manière spectaculaire, marge onduleuse, parfois lobée, festonnée, assez régulière, ne gardant que peu de traces de voile (abondant dans la jeunesse) chez l'adulte.

### **Lames :**

Jusqu'à 7,5 mm, assez serrées, émarginées, blanches à crème, pouvant brunir avec le temps, arête concolore, assez épaisse, fimbriée. Sporée blanche.

### **Stipe :**

35-90 x 10-14 mm, droit, arqué, courbé, évasé sous les lames puis égal ou renflé dans la moitié inférieure, une petite partie, blanchâtre et fibreuse sous les lames puis le reste est comme chaussé, guêtré par un voile assez consistant, qui se marque d'abord par une zone annelée brun roux puis par des guirlandes annulaires de la même couleur, plus ou moins bien dessinées, descendant jusqu'au bout de la base.

## Chair :


Assez ferme puis plus tendre, blanche à odeur et saveur de farine. Plutôt douce ou très faiblement amère.

## Microscopie :

**Spores (A) :** (3,7) 4,3 - 5,1 (5,6) x (2,7) 3,1 - 3,8 (4,2)  $\mu\text{m}$ , Q = (1,2) 1,25 - 1,5 (1,6) ; N = 100 ; Me = 4,6 x 3,5  $\mu\text{m}$  ; Qe = 1,3 ; très petites, généralement guttulées, parfois ellipsoïdes, lisses.

**Basides (B) :** (26,9) 29,4 - 31,6 (32,7) x (5,1) 5,2 - 6 (6,6)  $\mu\text{m}$  ; Q = (4,8) 5 - 6 (6,2) ; N = 10 ; Me = 30,4 x 5,6  $\mu\text{m}$  ; Qe = 5,4 ; sveltes, plutôt cylindriques, tétrasporiques ; boucles non observées.

**Revêtement (C) :** formé d'articles de 2,5-6  $\mu\text{m}$  d'épaisseur, redressés et embrouillés en surface mais couchés et plus ou moins parallèles dessous ; boucles non observées.



## Discussion :

Il n'existe que peu de tricholomes à voile spectaculaire. On peut citer caligatum, nauseosum parfois synonymisé à matsutake à stature, couleur et odeur bien différentes. Rare dans l'Est, il n'est pas présenté dans l'atlas des champignons de Suisse de Breitenbach & Kränzlin.

**Herbier : TrFo14111001**

Mesures sporales		
Longueur	Largeur	%
3,68	2,73	4
3,80	3,20	
3,90	3,05	
3,98	3,21	
4,10	3,23	30
4,18	3,08	
4,19	3,19	
4,19	3,34	
4,20	3,58	
4,22	3,12	
4,28	3,00	
4,31	3,04	
4,31	3,15	
4,31	3,30	
4,31	3,32	
4,32	3,40	
4,33	3,23	
4,34	3,10	
4,35	3,19	
4,35	3,37	
4,37	2,87	
4,37	3,33	
4,38	3,35	
4,39	3,15	
4,39	3,27	
4,39	3,81	
4,41	3,10	
4,42	3,08	
4,42	3,33	
4,42	3,36	
4,44	3,30	
4,44	3,51	
4,49	3,60	
4,49	3,80	
4,50	3,32	
4,51	3,30	
4,54	3,41	
4,55	3,43	
4,57	3,32	
4,57	3,47	
4,58	3,72	
4,59	3,02	
4,59	3,53	
4,60	3,24	
4,60	3,28	
4,60	3,41	
4,62	3,41	
4,64	3,51	
4,64	3,62	
4,64	3,66	
4,65	3,52	

4,66	3,40	52
4,66	3,41	
4,66	3,50	
4,66	3,61	
4,67	3,56	
4,68	3,30	
4,69	3,16	
4,70	3,67	
4,71	3,09	
4,71	3,29	
4,71	3,51	
4,75	3,34	
4,75	3,52	
4,75	3,62	
4,75	3,98	
4,76	3,60	
4,76	4,01	
4,77	3,82	
4,78	3,40	
4,79	3,47	
4,79	3,47	
4,80	3,36	
4,80	3,52	
4,82	3,64	
4,83	3,86	
4,84	3,14	
4,85	3,63	
4,86	3,58	
4,91	3,95	
4,95	3,55	
4,96	3,75	
4,97	3,73	
4,98	3,43	
4,99	3,44	
4,99	3,64	
5,01	3,90	13
5,02	3,83	
5,09	3,35	
5,09	3,47	
5,09	3,99	
5,13	3,68	
5,18	3,65	
5,18	4,07	
5,20	3,62	
5,26	3,76	
5,26	4,17	
5,32	3,76	1
5,46	3,49	
5,57	3,63	

