

C. variipes R. Hry.

C. variipes R. Hry. 1977, *Bull. Soc. Myc. Fr.* 93 (3) : 369-371 (basionyme)

Herb. P. Moëgne-L. n° 2936 – 4484

Sous-genre : *Phlegmacium* – Section : *Phlegmacium*

Sous-section : *Variipedes* – Série : *variipes*

NOTES DE RECOLTE – Chapeau 35-75 mm, convexe puis convexe-plan, charnu au centre, à marge enroulée-rabattue, ± lobée puis relevée et incisée; revêtement viscidule imbu, rapidement sec, mat, givré par des fibrilles blanchâtre argenté, laissant apparaître par détersion, la couleur du fond fauve roussâtre à roux orangé.

Stipe 30-50 x 10-13 (30) mm, très dur, typiquement napiforme-fusifforme, fortement appointi à la base et souvent coudé-genouillé dans la partie enterrée, fibrilleux, blanc au sommet, jaunissant à partir de la base et devenant fauve rouillé à la fin. Cortine subnulle.

Chair jaunâtre à jaune orangé par places. Odeur de bois de cèdre. Saveur douce.

Lames (4-6 mm) assez serrées, adnées à sinuées-adnées, crème ocracé puis fauve roussâtre; arête entière, plus claire.

Réactions chimiques non faites.

Quelques exemplaires, sous *Picea abies*, à la Croix au Bois (Ardennes), leg. P. Reumaux, le 15-10-1997 (herb. P. Moëgne-L. n° 4484).

Autre récolte, sous épicéas, à Semuy (Ardennes), leg. P. Reumaux, le 23-09-1992 (herb. P. Moëgne-L. n° 2936).

MICROSCOPIE – Suprapellis très mince, en cutis, à hyphes (x 3-5 µm), peu redressées, à pigment pariétal incrustant ou zébrant, jaune. Subpellis différencié, subcelluleux, formé d'articles (x 10-25 µm), à pigment en enduit, brun roux type 7.

Cellules marginales stériles, banales (x 6-9 µm).

Spores ovoïdes-pruniformes, à verrucosité sublisse, fine, mesurant (6) 6,5-7,5 (8,5) x 4,5-5,5 µm.

OBSERVATIONS – Espèce des conifères, surtout épicéas, très typique, que l'on ne peut reconnaître ni dans les textes, ni dans l'icône de Fries représentant *C. intentus*. Il n'est pas non plus possible d'en faire un *C. vespertinus* sous peine de frapper de non-sens les indications descriptives données par Fries.

C. intentus Fr.

C. intentus Fr. 1838, *Epicr.* : 272 (basionyme)

Herb. P. Moëgne-L. n° 3791

Sous-genre : *Phlegmacium* – Section : *Phlegmacium*

Sous-section : *Variipedes* – Série : *variipes*

NOTES DE RECOLTE – Chapeau 40-100 mm, obtusément convexe puis convexe-plan, souvent déformé (poussée cespiteuse), à marge enroulée puis droite, parfois révoluée; revêtement visqueux, amarescent, puis sec, d'un beau jaune lumineux (L60, M60), à disque + foncé (N57 – P57), fauve orangé, plus clair à la marge par des fibrilles denses et apprimées, blanchâtres.

Stipe 30-80 x 8-15 (20) mm, plein puis creux, subégal ou fusiforme-appointi, fibrillo-soyeux, blanchâtre puis jaunissant, avec quelques débris de voile jaune situés vers le bas. Cortine abondante, cotonneuse au début, blanche. Chair blanchâtre, à peine jaune paille à l'air, à légère odeur de bois de cèdre et saveur amarescente.

Lames souvent étroites (3-5 mm), serrées, sinuées-adnées ou émarginées, blanchâtres puis ocracé safrané; arête + claire, ± érodée.

Réactions chimiques : négatives aux réactifs usuels sauf AgNO₃ = rose violacé sur la chair.

En touffes, sous bouleaux, en terrain argilo-calcaire, Forêt de Belval (Ardennes), alt. 200 m, leg. P. et F. Reumaux, le 26-09-1992 (herb. P. Moëgne-L. n° 3791).

MICROSCOPIE – Suprapellis gélifié, peu épais, formé d'hyphes (x 3-8 µm) dissociées, redressées, lisses ou aspérulées (parfois zébrées) par un pigment jaune. Suprapellis peu différencié, à articles progressivement courts et larges (x 10-20 µm), fortement zébrés ou incrustés par un pigment pariétal brun roux. Sur quelques couches, en profondeur, apparaît une tendance subcelluleuse (type 6).

Cellules marginales stériles, basidioliformes (x 7-10 µm).

Spores elliptiques oblongues, à verrucosité très fine, mesurant (7) 7,5-10 (10,5) x 4,5-5,5 µm.

OBSERVATIONS – Concordance satisfaisante entre la récolte, les textes et l'icône publiée de Fries (pl. 261).



Spores de *C. variipes* (récolte n° 2936)



Spores de *C. intentus* (récolte n° 3791)