




Peniophora subpirispora: fragment de l'hyménium
 a spores de 16588
 b spores de 16604 in KOH Phloxine

Une récolte à Hygiophoria remarquable en Savoie

par Pierre-Arthur MOREAU
 9, square Delambre - F-75014 PARIS

Cet été, en explorant, comme chaque année, le massif de la Tarentaise en amont de Landry (Savoie), nous eûmes la surprise de rencontrer deux petits champignons blanchâtres, à quelques mètres l'un de l'autre, qui nous ont paru pour le moins étranges. L'habitus, et particulièrement les lames épaisses, nous ont fait penser à un hygrophore, mais les lames avaient un caractère remarquable : des gouttelettes rouges étaient nettement visibles sur l'arête. De plus, les surfaces étaient entièrement gélifiées et adhéraient au toucher. Au microscope, ce fut la surprise : des spores sphériques nettement épineuses ; exactement celles d'*Omphalaster asterosporus*, que nous avions observées quelques jours auparavant. Inutile de dire que nos flores classiques rejetaient en bloc une telle combinaison de caractères !

Les carpophores ont été sortis d'un taillis hygrophile dense de noisetiers, situé au cœur d'un massif des Alpes sur un site peu perturbé. Nous préférons donc à la thèse d'un apport exotique de spores ou de terre celle de l'originalité du site, appuyée par la présence, dans le voisinage, d'une pessière riche en espèces « indéterminées » ou rares dans les Alpes (*Tricholoma caligatum*, *Strobilomyces floccopus*, *Sarcodon lundellii*, nombreux hydres et quelques limacelles sans nom...). Au voisinage même de notre champignon, nous avons récolté plusieurs espèces originales qui restent anonymes, telles que *Entoloma* cf. *dichroum* (nombreux), *Inocybe* cf. *ionochlora*, etc.

Nous sommes retournés quinze jours plus tard sur la station, dans l'espoir évident d'effectuer une seconde récolte. Mais alors que ces deux champignons étaient pratiquement seuls sur le site, celui-ci avait été envahi entre temps de kyrielles de champignons blancs ou jaunâtres (*Pholiotina vestita*, *Entoloma sericellum*, *Cuphophyllus* sp., *Clitocybe* sp. etc.), parmi lesquels nous n'avons pas pu retrouver notre espèce. La station, facilement accessible, sera évidemment suivie l'an prochain avec la plus grande attention.

Description de nos specimens

Chapeau: 0,8-1,5 cm., convexe-bombé, lisse, adhérent-viscidule, non strié, ochracé jaunâtre pâle uniforme, non hygrophane. Cuticule gélifiée séparable. Marge un peu involutée.

Lames: 20 lames et 20 lamelles par chapeau, décourbées, espacées, épaisses, blanches. Arête blanche, gélifiée, séparable, exsudant des gouttelettes rougeâtres que l'on retrouve également sur les faces. Sporée non obtenue, vraisemblablement blanche.

Pied: 3-4 cm. x 2 mm., progressivement épaissi vers le bas, jaunâtre pâle recouvert d'une fine pruine grisee, finalement ponctué de rouge par les gouttelettes d'exsudation, fistuleux à cavité élargie à la base.