









## Cooke M.C. - Illustrations of British fungi (1881-1891)

(8 volumes + 1 petit volume Table)








# Farlow W.G. - Icones Farlowianae édition originale (1929) (1 volume)









**Fries E.M. - Icones selectae hymenomycetum  
nondum delineatorum (2 volumes)**

**édition originale (1877-1884)**






Fries E. - Sveriges Ätliga och Giftiga Svampar  
edition originale (1860) (1 volume)





Heim R. Wasson R.G. - Les champignons hallucinogènes du Mexique (1967)





Three red leather-bound volumes of the 'Hörbörger Bibliothek' by H. Kniep-Pelaussen. The spines are labeled 'HÖRBLINGE II', 'HÖRBLINGE III', and 'HÖRBLINGE IV'.

Tab. 1, f. 1—11 et t. 2, f. 1.

### Volkstümliche Namen.

Satanspilz, Satansröhrling. Boletus satana, Porcino malefico, Brisa matta (Bres.), Bolet satan (Mau-blanc), Bolet diabolique (Richon). Satanic Boletus (Cooke).

zu Tafel 1.

Fig. 9: Exemplar aus der Rhön (Tann 1921).  
 10: altes Exemplar, kaum noch mit Rot an den Poren;  
 nach das Netz ist nur noch an Stielspitze sichtbar  
 (Wernbach 1, Odenwald 13.8. 22.)  
 11: Schnitt eines gerösten Exemplares. Das Fleisch des  
 Stieles ist schwach gerötet. Bemerkenswert ist das  
 zarte Blau (Roßdörfer Wald 9. 21).

Es wurden gemäß:  
 Fig. 1-7 und 10: von Maria Kallenbach,  
 9: von Freiherren von Tann-Rathsamhausen,  
 8 und 11: von Franz Kallenbach.

Lenz, Schw., 1831, p. 67—72, t. 8, f. 33.

in erster Jugend die Unterhülle, 1862), nach oben zu rot-, dann weißlich-geigelt (zuweilen ungeigelt, 1862), unbefahrt, innerlich nicht hohl, 2–3 Zoll; 2–4 Zoll.  
**Geschm.** gering; nicht annehmlich.  
**Ger.** erstickend, nicht annehmlich (durch Ausdehnung der Pille in der Stube wurde es Lenz jedesmal anwohl, 1940).  
**Sp.** geißel-erdtrüben.  
**Standort:** in Bergkäten, unter Eichen (Hasein, Buchen, selten im Nadelwald, 1862). Ithenhin, Waltershausen usw. (Thüringen), August–September. (Auf Tsch. Muschelkalk und Keuper, 1862.) (Andergast, 1891).  
**Gifftig.** (Zuweilen gar keine Giftwirkung, 1840.) Dem *Boletus pachypus* ähnlich.


ünntem Rändchen dem kugeligen Stiel

[illegible]

<sup>2)</sup> Große Hölzer erwecken den Eindruck von im Lenz liegenden Tälern.

<sup>2)</sup> Große Hölzer erwecken den Eindruck von im Lenz liegenden Tälern.





**1**



*Boletus satanas* Lenz








**Leuba F. - Les champignons comestibles**  
**2ème édition (1906) (1 volume)**





Tulasne & Tulasne - Selecta fungorum  
carpologia (3 volumes) (traduction anglaise)





Sébastien Vaillant

Botanicon parisiense ou dénombrement par  
ordre alphabétique des plantes qui se  
trouvent aux environs de Paris (1727)

BOTANICON PARISIENSE  
OU  
DENOMBREMENT  
PAR  
ORDRE ALPHABETIQUE  
DES PLANTES,

Qui se trouvent  
AUX ENVIRONS DE PARIS  
Compris dans la Carte de la Prevoté & de l'Election de la dite Ville  
par le Sieur DANET GENDRE année MDCCLXII.

Avec plusieurs Descriptions des Plantes, leurs Synonymes,  
le Temps de fleurir & de grainer

Et une Critique des Auteurs de Botanique  
PAR FEU MONSIEUR


SEBASTIEN VAILLANT,  
De l'Académie Royale des Sciences, & Démonstrateur des Plantes  
au Jardin Royal de Paris.

Enrichi de plus de trois cents Figures, dessinées par le Sieur

CLAUDE AUBRIET,  
Peintre du Cabinet du Roy.



A LEIDE & A AMSTERDAM,  
JEAN & HERMAN VERBEEK.  
ET  
BALTHAZAR LAKEMAN.  
MDCCLXXII.



PLANTARUM EXPLICATIO.

TAB. XIII.

- Fig. 1. Fungoides, fuscum, acetabuli forma, externe ramificatum. Sive Fungoides maximum, pyxidatum.
- Fig. 2. Fungoides, nigricans, majus cornucopiae forma. externe spectatum a latere.
- Fig. 3. Idem superne visum.
- Fig. 4. Fungus minor, pilei superficie flocculis fuscis villosa. a latere visus.
- Fig. 5. Idem ab inferiori parte spectatus oblique.
- Fig. 6. Idem verticaliter sectus bifariam, plano transiente per media pilei & pedunculi: ut caro, lamellae, hirti aculeati flocculi, pedunculi plenitudo, cernantur.
- Fig. 7. Fungus gelatinus, flavus. spectatus a parte inferiore, maturus.
- Fig. 8. Idem, erectus, a latere spectatus.
- Fig. 9. Idem erectus, desuper visus.
- Fig. 10. Fungus, minor, totus rufus. desuper visus, naturali magnitudine.
- Fig. 11. Idem a parte inferiori spectatus.
- Fig. 12. Idem verticaliter bifariam sectus, ut sectio pedunculum transeat.
- Fig. 13. Fungoides, qui Fungus minimus, scutellatus, coloris aurantii. *Raj. Synops. XVII. N. 26.*
- Fig. 14. Idem diversis nascendi temporibus spectatum, superne, inferne. juxta literas a. b. c. d. e.